



Kreuzen Sie bitte jeweils eine richtige Antwort an und übertragen Sie diese auf den Antwortbogen.

- 1. Wie viele Menschen leiden in der Bundesrepublik unter Blasenschwäche?**
 - A. Weniger als zwei Millionen.
 - B. Zwei bis drei Millionen.
 - C. Vier bis sechs Millionen.
 - D. Fünf bis acht Millionen.
- 2. Welche Funktion erfüllt die Blase?**
 - A. Sie speichert den Endharn, der in den Nieren gebildet wird.
 - B. Sie ist Entgiftungsorgan des Körpers.
 - C. Sie sorgt für die Filtration des Harns.
 - D. Sie übernimmt immunmodulatorische Aufgaben.
- 3. Ab welchem Füllungsvolumen ist ein Harndrang normalerweise spürbar?**
 - A. Ab einer Menge von 100 bis 250 Milliliter Urin.
 - B. Ab einer Menge von 200 bis 300 Milliliter Urin.
 - C. Ab einer Menge von 300 bis 500 Milliliter Urin.
 - D. Ab einer Menge von 500 bis 600 Milliliter Urin.
- 4. Für welche Art von Inkontinenz ist Urinverlust beim Lachen oder Niesen typisch?**
 - A. Überlaufinkontinenz.
 - B. Belastungsinkontinenz.
 - C. Dranginkontinenz.
 - D. Bei allen drei Formen.
- 5. Welche Form der Inkontinenz wird auch als „Syndrom der überaktiven Blase“ bezeichnet?**
 - A. Dranginkontinenz.
 - B. Sowohl Drang- als auch Belastungsinkontinenz.
 - C. Überlaufinkontinenz.
 - D. Belastungsinkontinenz.
- 6. Welche Ursachen können zu einer Dranginkontinenz führen?**
 - A. Schwangerschaften.
 - B. Übergewicht.
 - C. Beckenbodenschwäche.
 - D. Blasenentzündungen.
- 7. Welche Art der Inkontinenz wird unter anderem mit dem Antidepressivum Duloxetin behandelt?**
 - A. Belastungsinkontinenz.
 - B. Dranginkontinenz.
 - C. Überlaufinkontinenz.
 - D. Alle drei Formen.
- 8. Was ist der Vorteil des transdermalen therapeutischen Systems mit dem Wirkstoff Oxybutynin?**
 - A. Durch Umgehung der Blut-Hirn-Schranke werden zentrale Nebenwirkungen reduziert.
 - B. Durch Umgehung des Magen-Darm-Traktes wird die Nebenwirkung der Mundtrockenheit reduziert.
 - C. Das Pflaster muss nur einmal in der Woche gewechselt werden.
 - D. Es treten keinerlei anticholinergen Nebenwirkungen auf.
- 9. Welchen Effekt haben alpha-Rezeptorenblocker?**
 - A. Sie erhöhen den Muskeltonus der Blase.
 - B. Sie stärken die Schließmuskulatur und sind daher günstig zur Therapie der Belastungsinkontinenz.
 - C. Sie führen als eine Begleitwirkung zur Relaxation der Atemwegsmuskulatur.
 - D. Sie entspannen die Blasenmuskulatur und senken den Auslasswiderstand.
- 10. Welche pflanzlichen Urologika gelten als Harnwegsdesinfizienzien und sind zur Durchspülungstherapie geeignet?**
 - A. Extrakte aus Bärentraubenblättern und Birkenblättern.
 - B. Extrakte aus Pfefferminzblättern.
 - C. Extrakte aus Thymianblättern.
 - D. Extrakte aus Kamillenblüten und dem Arzneikürbis.