



Kreuzen Sie bitte jeweils eine richtige Antwort an und übertragen Sie diese auf die Titelseite der Fortbildung.

**1. Die Häute, die den Augapfel von außen nach innen umschließen, heißen ...**

- A. Netzhaut, Aderhaut, Lederhaut.
- B. Aderhaut, Lederhaut, Netzhaut.
- C. Lederhaut, Aderhaut, Netzhaut.

**2. Unter Akkomodation versteht man ...**

- A. die Regulierung des Lichteinfalls durch Verengen oder Erweitern der Pupille.
- B. das Scharfstellen des Auges auf verschiedene Distanzen durch Verformung der Linse.
- C. das Farbsehen.

**3. Die Zapfen auf der Netzhaut ...**

- A. dienen dem Farb- und dem Scharfsehen.
- B. reagieren auf Licht.
- C. sind vor allem im Randbereich zahlreich zu finden.

**4. Die Makula lutea ...**

- A. wird auch blinder Fleck genannt.
- B. ist die Stelle des schärfsten Sehens.
- C. ist die Stelle, an der der Sehnerv das Auge in Richtung Gehirn verlässt.

**5. Bei einer allergischen Bindehautentzündung ...**

- A. können Augentropfen mit H1-Antihistaminika oder Mastzellstabilisatoren abgegeben werden.
- B. sind Weißmacher mit alpha-Sympathomimetika das Mittel der Wahl.
- C. verordnet der Augenarzt antibiotische Augentropfen.

**6. Der Graue Star beginnt mit ...**

- A. einer Einschränkung des Sehens im äußeren Gesichtsfeld.
- B. Ausfällen im zentralen Bereich.
- C. einem Blick wie durch einen Schleier.

**7. Beim Grünen Star ...**

- A. ist der Kammerwinkel in der Regel verengt oder verlegt.
- B. unterscheidet man das Weitwinkel- und das Engwinkelglaukom.
- C. bleibt auch im Endstadium das periphere Gesichtsfeld erhalten.

**8. Die feuchte Form der AMD ...**

- A. ist durch das Einwachsen poröser Blutgefäße in die Netzhaut gekennzeichnet.
- B. betrifft etwa 85 Prozent der Personen mit altersabhängiger Makuladegeneration.
- C. kann durch die Einnahme antioxidativer Substanzen aufgehalten werden.

**9. Bei einer diabetischen Retinopathie ...**

- A. wird aufgrund von Durchblutungsstörungen die Regenbogenhaut zerstört.
- B. können Blutgefäße in Netzhaut und Glaskörper einwachsen.
- C. kann es im Endstadium zur völligen Erblindung kommen.

**10. Das Sicca-Syndrom ...**

- A. tritt bei Frauen nach den Wechseljahren quasi gar nicht mehr auf.
- B. kann auch ein Begleitsymptom bei Diabetes mellitus sein.
- C. kann nur durch Augensalben wirksam behandelt werden.