

Kreuzen Sie bitte jeweils eine richtige Antwort an und übertragen Sie diese auf die Titelseite der Fortbildung.

**1. Hämorrhiden im eigentlichen Sinne sind ...**

- A. knotenförmig erweiterte Analvenen.
- B. ein arteriovenöses Gefäßposter, das der Feinabdichtung des Darms nach außen dient.
- C. schmerzhafte Einrisse in der Darmwand.

**2. Die Hauptursache für das Hämorrhidalleiden ist ...**

- A. falsches Stuhlverhalten.
- B. Übergewicht.
- C. eine überwiegend sitzende Tätigkeit.

**3. Ist der innere Schließmuskel angespannt, ...**

- A. kann das Blut aus den Hämorrhiden abfließen.
- B. wird die Abdichtfunktion der Hämorrhiden ersetzt.
- C. sind die Hämorrhiden mit Blut gefüllt und verschließen den Darm.

**4. Im Stadium I des Hämorrhidalleidens ...**

- A. sind die erweiterten Hämorrhiden bereits tastbar.
- B. schmerzen und jucken die Hämorrhiden lediglich.
- C. sind die Hämorrhiden auch proktoskopisch noch nicht sichtbar.

**5. Hämorrhiden vierten Grades ...**

- A. sind an der Blutauflagerung auf dem Stuhl zu erkennen.
- B. können nur noch von Hand reponiert werden.
- C. werden fast immer von Stuhlschmierer begleitet.

**6. Eine Analvenenthrombose ...**

- A. ist eine Hämorrhide, die von außen sichtbar ist.
- B. kann zu einer sehr schmerzhaften Schwellung führen.
- C. kommt bei Frauen häufiger vor als bei Männern.

**7. Einrisse in der Analschleimhaut nennt man ...**

- A. Marisken.
- B. Analfissur.
- C. Analfistel.

**8. In der Selbstmedikation ist der Arzneistoff der ersten Wahl bei Hämorrhiden ...**

- A. Hamamelis-Extrakt.
- B. Hydrokortisonacetat.
- C. Lidocain.

**9. Das Veröden der Hämorrhiden ...**

- A. wird häufig mit Polidocanol vorgenommen.
- B. ist in allen Stadien des Hämorrhidalleidens möglich.
- C. wird auch als Hämorrhidektomie bezeichnet.

**10. Die Operation von Hämorrhiden ...**

- A. wird in jedem Stadium durchgeführt.
- B. wird stets ambulant beim Proktologen durchgeführt.
- C. wird am häufigsten mit der schonenden Stapler-Methode durchgeführt.