

ZEHN AUSGEWÄHLTE HÄUFIGERE MEDIKAMENTENINTERAKTIONEN

Wirkstoff 1	Wirkstoff 2	Effekte	Was tun?
ACE-Hemmer/ AT1-Blocker	NSAR/Coxibe	Wirkabschwächung des ACE-Hemmers, zusätzliche Nierenfunk- tionseinschränkung	1. Blutdruckkontrolle, 2. Vermeiden, 3. Wahl eines anderen Analgetikums anraten
Diuretika	NSAR/Coxibe	Wirkabschwächung des Diuretikums	siehe oben
CSE-Hemmer (Pravastatin und Fluvastatin haben wenig relevante Interaktionen)	Makrolidantibiotika (außer Azithromycin), Amiodaron, Fluconazol, Fibrate, Verapamil	Gegenseitige Wirk- verstärkung, Risiko Rhabdomyolyse (Auflösung querge- streifter Muskelfasern)	1. CSE-Hemmer während Antibiotika pausieren, 2. Vermeiden, 3. Wechsel zu Pravasta- tin anraten
Phenprocoumon	Cotrimoxazol, Metroni- dazol, Doxycyclin, Amo- xicillin/Clavulansäure, NSAR/Coxibe, Rifampi- cin, Allopurinol, Amioda- ron, Makrolidantibiotika, Ginseng, Ginkgo	Blutungsrisiko, Wirkungs-Verstärkung oder -Abschwächung	1. Vermeiden, 2. Generell: bei dauerhaft neuem Medikament zu Phenprocoumon INR (International No- malized Ratio = Maß für die Blutgerinnung) engmaschig kontrol- lieren
Beta-Blocker	Verapamil, Diltiazem	Kann schwerste Herzrhythmusstörungen verursachen	Kontraindiziert
Glukokortikoide	NSAR	Risiko von Magen- Darm-Trakt-Blutungen	1. Vermeiden, 2. wenn NSAR un- umgänglich zu zusätzlichem PPI (Protonenpumpen-In- hibitor wie Omeprazol, Pantoprazol) raten
L-Thyroxin	(polyvalente) Kationen	verminderte Wirksamkeit	1. mind. 2 Std. Abstand, 2. Einnahme von L- Thyroxin nüchtern möglichst direkt nach Aufstehen
PDE-Hemmer für erektile Dysfunktion	Nitrate, Molsidomin	unbehandelbare, ev. tödliche Hypotonie	Kontraindiziert
Fentanyl	SSRI (Citalopram, Fluo- xetin, Paroxetin, Sertra- lin), SNRI (Venlafaxin), MAO-Hemmer (Moclo- bemid, Selegilin)	Serotonin-Syndrom: Bewusstseinsverände- rung, instabiler Blut- druck, neuromuskuläre Veränderungen, Übel- keit, Erbrechen; poten- ziell lebensgefährlich	1. Vermeiden, 2. Falls dennoch ärztli- cherseits Kombination erwünscht, genaue Beobachtung (Symp- tome) anraten
Trizyklische Antidepressiva	Anticholinergika (z.B. Oxybutynin)	anticholinerge Effekte (Mundtrockenheit, Schwindel, Verwirrtheit)	1. Erkennen, 2. Vermeiden, 3. Falls dennoch ärzt- licherseits gewünscht, Symptom-Beobach- tung anraten