

Testen Sie Ihr Fachwissen!

Wir stellen Ihnen in unserer monatlichen Quiz-Reihe drei Fragen rund um Wirkstoffe, Interaktionen, Neben- und Wechselwirkungen – alles Themen, die in Ihrem Apothekenalltag eine wichtige Rolle spielen.

Unsere Fragen im Juli:

1. Welche Aussage zum Thema Diabetes ist richtig?

- a) Typ-1-Diabetes beginnt immer mit einer Insulinresistenz.
- b) Typ-2-Diabetes beruht auf einer Autoimmunerkrankung.
- c) Ein wichtiger Risikofaktor beim Typ-2-Diabetes ist die genetische Disposition.

2. Was sollte man bei einer gleichzeitigen Verordnung von Ibuprofen und Acetylsalicylsäure, das zur Kardioprotektion eingenommen wird, beachten?

- a) Acetylsalicylsäure sollte morgens mindestens eine Stunde vor Ibuprofen eingenommen werden.
- b) Beide Wirkstoffe sollten gemeinsam zur Mahlzeit eingenommen werden.
- c) Ibuprofen sollte 30 Minuten vor Acetylsalicylsäure eingenommen werden.

3. Welcher Beratungshinweis gehört nicht zur Abgabe von kortisonhaltigen Inhalationsmitteln bei Asthma?

- a) Spülen Sie nach der Einnahme den Mund aus.
- b) Benutzen Sie das Dosieraerosol nicht beim akuten Asthmaanfall.
- c) Kortisonhaltige Medikamente sollten nicht länger als zwei Wochen eingenommen werden.

Die Lösungen finden Sie online auf unserer Homepage unter www.pta-aktuell.de/aktion. Klicken Sie sich rein!